

## Lijst van werkzame bestanddelen in producten die in aanmerking kunnen komen voor algemene verkoop (AV) door middel van een versnelde administratieve afhandelingsprocedure

Lijst vastgesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)  
d.d. 17 december 2019 – Volgnr. 16

Naar gelang het bestanddeel gelden bepaalde voorwaarden en opmerkingen. In geval er in onderstaande tabel wordt gesproken over tabletten dan kan dit ook worden gelezen als iedere andere vaste immediate release orale toedieningsvorm in overeenkomende sterkte.

Stof	Voorwaarden
<b>Acetylcysteine</b>	geen
<b>Aciclovir</b>	uitsluitend als crème
<b>Alginaat</b>	uitsluitend voor de toepassing als zuurbinder, eventueel in combinatie met andere zuurbindende bestanddelen
<b>Alginезuur</b>	uitsluitend voor de toepassing als zuurbinder, eventueel in combinatie met andere zuurbindende bestanddelen
<b>Aluminiumhydroxide</b>	uitsluitend voor de toepassing als zuurbinder, eventueel in combinatie met andere zuurbindende bestanddelen
<b>Aluminiumoxide</b>	uitsluitend voor de toepassing als zuurbinder, eventueel in combinatie met andere zuurbindende bestanddelen
<b>Ambroxolhydrochloride</b>	Uitsluitend als zuigtablet; maximaal 42 tabletten; maximaal 20 mg/tablet
<b>Ammoniakale anijsspiritus</b>	uitsluitend als bestanddeel in hoestsiroop
<b>Amylmetacresol</b>	uitsluitend als bestanddeel in zuigtabletten; uitsluitend zonder menthol ; maximaal 84 tabletten; maximaal 0,6 mg/tablet
<b>Ascorbinezuur</b>	geen
<b>Azelastine hydrochloride</b>	uitsluitend als neusspray; uitsluitend voor de behandeling van hooikoorts

<b>Bamipine dilactaat</b>	uitsluitend voor dermaal gebruik bij insectenbeten; maximaal 20 g
<b>Benzydamine hydrochloride</b>	uitsluitend in zuigtabletten en crème; maximaal 21 tabletten; maximaal 3 mg/tablet
<b>Broomhexine hydrochloride</b>	geen
<b>Cadexomeerjodium</b>	uitsluitend in zalf en verband bij geïnfecteerde wonden; zalf maximaal 40 g
<b>Calcium (ca<sup>2+</sup>)</b>	uitsluitend voor de indicatie verhoogde kalkbehoefte
<b>Calciumcarbonaat</b>	voor de indicatie verhoogde kalkbehoefte en de toepassing als zuurbinder, eventueel in combinatie met andere zuurbindende bestanddelen
<b>Calciumgluconaat 1-water</b>	uitsluitend voor de indicatie verhoogde kalkbehoefte
<b>Capsicum extract</b>	uitsluitend als dermale crème
<b>Carbocisteine</b>	uitsluitend als hoestmiddel
<b>Cetirizine dihydrochloride</b>	uitsluitend tabletten. uitsluitend voor volwassenen en kinderen > 6jr; maximaal 10 tabletten; maximaal 10 mg/tablet
<b>Chloorhexidine digluconaat</b>	uitsluitend als oplossing; maximaal 15 ml
<b>Clotrimazol</b>	Uitsluitend als voetcrème en strooipoeder bij de behandeling van tinea pedis (voetschimmel) veroorzaakt door dermatofyten.
<b>Coffeine</b>	uitsluitend in combinatie met paracetamol; maximaal 50 mg/tablet; zie verder voorwaarden bij paracetamol
<b>Cromoglycaat dinatrium</b>	geen
<b>Dequalinium dichloride</b>	uitsluitend in zuigtabletten; uitsluitend zonder menthol; maximaal 42 tabletten; maximaal 0,25 mg/tablet

<b>Dichloorbenzylalcohol</b>	uitsluitend in zuigtabletten; uitsluitend zonder menthol; maximaal 84 tabletten; maximaal 1,2 mg/tablet
<b>(Es)omeprazol</b>	uitsluitend tabletten; uitsluitend voor volwassenen; maximaal 7 tabletten; maximaal 20mg/tablet.
<b>Eucalyptus olie</b>	uitsluitend in verkoudheidsmiddel; niet in combinatie met menthol
<b>Foliumzuur</b>	uitsluitend als aanvulling vitamine behoefte
<b>Glucose 0-water</b>	
<b>Glucose 1-water</b>	
<b>Glycolsalicylaat</b>	uitsluitend als wrijfmiddel
<b>Heparinoiden</b>	uitsluitend als hulpmiddel bij behandeling sportblessures en letsels bij ongevallen
<b>Hexetidine</b>	uitsluitend als mondspoeling
<b>Histamine dihydrochloride</b>	uitsluitend als wrijfmiddel
<b>Honing</b>	
<b>Ibuprofen</b>	Uitsluitend vaste orale toedieningsvormen van 200 mg/doseereenheid; maximaal 12 doseereenheden
<b>Jodium</b>	uitsluitend in zalf en verband bij geïnfecteerde wonden; zalf maximaal 40 g
<b>Kaliumchloride</b>	uitsluitend als ORS
<b>Kaliumwaterstofcarbonaat</b>	uitsluitend voor de toepassing als zuurbinder, eventueel in combinatie met andere zuurbindende bestanddelen

<b>Kamfer</b>	uitsluitend in verkoudhoudsmiddel; niet in combinatie met menthol
<b>Kool, geactiveerd</b>	
<b>Lidocaine</b>	Bij beginnende keelpijn uitsluitend in zuigtabletten, maximaal 56 tabletten; maximaal 1 mg/tablet, daarnaast als dentaal gebruik bij baby's
<b>Loperamide hydrochloride</b>	Uitsluitend voor volwassenen en kinderen >8 jr; maximaal 10 tabletten; maximaal 2mg/tablet; bij kinderen uitsluitend in combinatie met ORS (deze voorwaarde dient op de verpakking te worden vermeld)
<b>Loratadine</b>	Uitsluitend tabletten. Uitsluitend voor volwassenen en kinderen > 2 jaar; maximaal 10 tabletten; maximaal 10 mg/tablet. Indien het doseringsvoorschrift niet uitgevoerd kan worden, dient op de verpakking vermeld te worden: "De tablet is niet geschikt voor kinderen met een lichaamsgewicht van minder dan 30 kg.
<b>Magnesium(sub)carbonaat</b>	uitsluitend voor de toepassing als zuurbinder, eventueel in combinatie met andere zuurbindende bestanddelen
<b>Magnesiumhydroxide</b>	uitsluitend voor de toepassing als zuurbinder, eventueel in combinatie met andere zuurbindende bestanddelen
<b>Magnesiumtrisilicaat</b>	uitsluitend voor de toepassing als zuurbinder, eventueel in combinatie met andere zuurbindende bestanddelen
<b>Methylnicotinaat</b>	uitsluitend in spierbalsems/zalven
<b>Methylsalicylaat</b>	uitsluitend in spierbalsems/zalven
<b>Myrtecaine</b>	uitsluitend in wrijfmiddel
<b>Natriumwaterstofcitraat-1,5-water</b>	uitsluitend als ORS
<b>Nicotine</b>	Uitsluitend pleisters, kauwgom en sublinguale tabletten. Voor kauwgom geldt een maximum van 504 stuks per verpakking.

<b>Nicotinamide</b>	geen
<b>Paracetamol</b>	voor kinderen in zetabletten en tabletten maximaal 10 stuks en in drank/suspensie in equivalent volume; voor volwassenen max 20 tabletten en max 500 mg/tablet of max 10 zetabletten en max 1000 mg/zetablet
<b>Penciclovir</b>	uitsluitend als crème
<b>Povidonjodium</b>	uitsluitend als oplossing; maximaal 30 ml
<b>Pramocaine hydrochloride</b>	uitsluitend voor dermaal gebruik bij insectenbeten; maximaal 15 g
<b>Propyl-4-hydroxybenzoaat</b>	uitsluitend in zuigtabletten, maximaal 56 tabletten; maximaal 1,8 mg/tablet
<b>Pyridoxine hydrochloride</b>	geen
<b>Ranitidine hydrochloride</b>	Uitsluitend tabletten, maximaal 14 tabletten, maximaal 75 mg ranitidine /tablet
<b>Riboflavine</b>	geen
<b>Saccharose</b>	
<b>Terbinafine</b>	Uitsluitend als topicaal middel voor de indicatie voetschimmel (tinea pedis)
<b>Terpentijn olie</b>	uitsluitend in verkoudheidsmiddel; niet in combinatie met menthol
<b>Thiamine hydrochloride</b>	geen
<b>Thymol</b>	uitsluitend in verkoudheidsmiddel; niet in combinatie met menthol
<b>Tijm kruid</b>	in pastilles (in maximale verpakkingsgrootte van 40 pastilles) en hoestsiroop; niet in combinatie met menthol

<b>Tocoferol, dl-alfa- acetaat</b>	maximaal 100 tabletten; maximaal 50 mg/tablet
<b>Tripelennamine hydrochloride</b>	uitsluitend voor dermaal gebruik bij insectenbeten; maximaal 10 g
<b>Ureum</b>	uitsluitend in zalf/crème
<b>Waterstofperoxide</b>	uitsluitend als mondspoeling; uitsluitend verdund